

Към Рег. № 20020535

Разрешение № КГ.МЗ.МР- / 61713

Добавление № 22-02-2023

Листовка: информация за потребителя

КОЛДРЕКС® МаксГрип Лимон 1000 mg/10 mg/40 mg прах за перорален разтвор
 парацетамол/фенилефринов хидрохлорид/аскорбинова киселина
COLDREX® MaxGrip Lemon 1000 mg/10 mg/40 mg powder for oral solution
 paracetamol/phenylephrine hydrochloride/ascorbic acid

Прочетете внимателно цялата тази листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява КОЛДРЕКС МаксГрип Лимон и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете КОЛДРЕКС МаксГрип Лимон
3. Как да приемате КОЛДРЕКС МаксГрип Лимон
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате КОЛДРЕКС МаксГрип Лимон
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява КОЛДРЕКС МаксГрип Лимон и за какво се използва

КОЛДРЕКС МаксГрип Лимон е лекарствен продукт за облекчаване на симптомите при настинка и грип при възрастни и съдържа три активни съставки:

- парацетамол, който облекчава болката и понижава високата температура;
- фенилефринов хидрохлорид, деконгестант, който отпушва носа и синусите, помагайки Ви да дишате по-леко;
- витамин С (аскорбинова киселина), който се прилага при грип и настинки поради повишените нужди на организма, особено в началния стадий на заболяването.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете КОЛДРЕКС МаксГрип Лимон

Да не се надвишава препоръчаната доза.

Да се прилага най-ниската доза, която има терапевтичен ефект.

КОЛДРЕКС МаксГрип Лимон съдържа парацетамол и деконгестант.

Не използвайте този лекарствен продукт, ако приемате лекарства по лекарско или без лекарско предписание, които съдържат парацетамол за повлияване на болка, треска, симптомите на настинка и грип или сънотворни.

Не приемайте КОЛДРЕКС МаксГрип Лимон, ако:

- сте алергични (свръхчувствителни) към парацетамол, фенилефринов хидрохлорид, витамин С или някое от помощните вещества;
- сте на лечение с антидепресанти, като инхибитори на моноаминооксидазата;



Посъветвайте се с Вашия лекар, ако някоя от гореизброените се отнася до Вас или:

- имате чернодробно или бъбречно заболяване;
- имате хипертония, сърдечно заболяване, съдово заболяване (болест на Рейно), което се появява като болка в пръстите;
- сте диабетик. Всяко саше съдържа 3,725 g захар;
- страдате от повишена функция на щитовидната жлеза;
- имате глаукома;
- имате проблеми с простатата и/или трудно уриниране;
- приемате други лекарства (виж по-надолу);
- страдате от вродена непоносимост към фруктоза, глюкозен/галактозен синдром на малабсорбция или захарно/изомалтозен дефицит.
- ако имате феохромоцитом (тумор в близост до бъбрека),
- инфекцията е продължителна, тъй като това може да увеличи риска от метаболитна ацидоза.

Признаците на метаболитна ацидоза включват:

- дълбоко, учестено, затруднено дишане;
- позиви за повръщане, повръщане;
- загуба на апетит;

Незабавно уведомете лекаря си, ако имате комбинация от тези симптоми.

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да вземете Колдрекс МаксГрип Лимон ако приемате:

- други лекарства, съдържащи парацетамол;
- други лекарства, съдържащи деконгестант или за настинка;
- варфарин или лекарства, използване за разреждане на кръвта;
- бета-блокери, използвани за сърдечни заболявания и високо кръвно налягане;
- дигоксин;
- средства за потискане или стимулиране на апетита;
- лекарства за лечение на депресия като трициклически антидепресанти (напр. амитриптилин).

Кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате тези или някакви други лекарства, включително растителни или лекарства без рецепта.

Други лекарства и парацетамол

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате:

- флуоклоксацилин (антибиотик), тъй като съществува сериозен риск от отклонения в кръвните показатели и алкално-киселинното равновесие (метаболитна ацидоза с голяма анионна разлика), което изисква спешно лечение и може да се прояви особено при пациенти с тежка степен на бъбречно увреждане, сепсис (когато бактерии и техните токсини са попаднали в кръвообращението, което води до увреждане на органите), недोхранване, хроничен алкохолизъм и при употреба на максималната дневна доза парацетамол.

Бременност и кърмене

Лекарството не се препоръчва по време на бременност.

Ако кърмите се посъветвайте с Вашия лекар или фармацевт преди да приемате КОЛДРЕКС МаксГрип Лимон.

Шофиране и работа с машини

Този продукт може да причини замаяване. Ако Ви се случи, не шофирайте и не работете с машини.



Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него, преди да приемете този лекарствен продукт.

Това лекарство съдържа 116 mg натрий (основна съставка на готварската/трапезната сол) във всяко саше. Това количество е еквивалентно на 6% от препоръчителния максимален дневен хранителен прием на натрий за възрастен.

Съдържа 6,65 mg глюкоза на доза. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него, преди да приемете този лекарствен продукт.

3. Как да приемате КОЛДРЕКС МаксГрип Лимон

За перорално приложение.

Обичайната доза за възрастни (включително в старческа възраст) и деца на и над 12 години е едно саше на всеки 4 или 6 часа при необходимост.

Не взимайте повече от 4 (четири) сашета за период от 24 часа.

Да не се приема повече от 7 (седем) дни.

Да не се дава на деца под 12 години.

КОЛДРЕКС МаксГрип Лимон се приема под формата на топла напитка.

1. Изсипете съдържанието на едно саше в чаша, добавете топла вода (около 125 ml) и разбъркайте добре.
2. Ако е необходимо добавете студена вода.
3. Ако предпочитате добавете захар или мед.

Ако високата температура продължи повече от 3 дни, а другите симптоми – повече от 5 дни се консултирайте с Вашия лекар и спрете приема на КОЛДРЕКС МаксГрип Лимон.

Не надвишавайте посочената доза.

Ако сте приели повече от необходимата доза КОЛДРЕКС МаксГрип Лимон

Ако вземете повече от препоръчаната доза незабавно потърсете лекарска помощ и кажете точното количество, което сте приели. Предозирането с парацетамол може да причини увреждане на черния дроб.

Ако сте пропуснали да приемете КОЛДРЕКС МаксГрип Лимон

Приемете дозата КОЛДРЕКС МаксГрип Лимон, когато си спомните.

Не взимайте повече от една доза на всеки 4 часа. Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

4. Възможни нежелани реакции

Както при всички лекарства, така и при КОЛДРЕКС МаксГрип Лимон може да се наблюдават нежелани лекарствени реакции. Нежеланите реакции са редки и могат да включват главоболие, замаяване, нервност, безсъние, повишено кръвно налягане, гадене и повръщане.

Ако някоя от гореизброените нежелани реакции Ви тревожи прекалено или имате някакви нежелани реакции, неспоменати в тази листовка се консултирайте с Вашия лекар.

Спрете приема на КОЛДРЕКС МаксГрип Лимон ако наблюдавате:

- алергични реакции, напр. сърбеж, обрив, проблеми с дишането, поява на оток по устните, езика, гърлото или лицето, язви в устата;
- неочаквано кървене или склонност към насиняване;
- проблеми със сърдечния ритъм (неочаквано сърцебиене);
- загуба или нарушение на зрението;



- или сте имали проблеми с дишането при употреба на ацетилсалицилова киселина или нестероидни противовъзпалителни лекарства в миналото.
- Докладвани са много редки случаи на сериозни кожни реакции.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, Тел.: +35 928903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате КОЛДРЕКС МаксГрип Лимон

Да се пази на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява при температура под 25°C.

Не използвайте след датата, посочена на опаковката.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа КОЛДРЕКС МаксГрип Лимон

Всяко саше съдържа 6,427 g бял прах с аромат на лимон.

Активни вещества:

парацетамол	1000 mg
фенилефринов хидрохлорид	10 mg
аскорбинова киселина (витамин С)	40 mg

Всяко саше съдържа също така лимонена киселина, силициев диоксид, царевично нишесте, натриев цитрат, захар, натриев цикламат, захарин натрий, куркумин 5% (съдържа глюкоза), лимонова есенция.

Как изглежда КОЛДРЕКС МаксГрип Лимон и какво съдържа опаковката

COLDREX® MaxGrip Lemon

Опаковката съдържа 5, 8, 10 или 14 сашета.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба:

Adriatic BST d.o.o., Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana, Словения

Производител:

Omega Pharma International N.V.,
Venecoweg 26, 9810 Nazareth,
Белгия

Срок на годност – 3 години

Без лекарско предписание.

Последна актуализация: Януари 2023 г.

(Perrigo logo)

