

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВОВАТА

Листовка - Приложение 2

Им. Веса № 20000786

Серийно № BG/MMP-59533

18.05.2021

**Листовка: Информация за потребителя**

**ГелоМиртол® форте 300 mg** стомашно-устойчиви капсули, меки  
 Дестилат от смес от пречистени етерични масла от евкалипт, сладък портокал,  
 мирта и лимон (66:32:1:1)

**GeloMyrtol® forte 300 mg** gastro-resistant capsules, soft  
 Distillate of a mixture of rectified essential oils of eucalyptus, sweet orange, myrtle  
 and lemon (66:32:1:1)

**Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.**

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

**Какво съдържа тази листовка**

1. Какво представлява ГелоМиртол® форте и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате ГелоМиртол® форте
3. Как да приемате ГелоМиртол® форте
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ГелоМиртол® форте
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

**1. Какво представлява ГелоМиртол® форте и за какво се използва?**

ГелоМиртол® форте е мека стомашно-устойчива капсула.

ГелоМиртол® форте се използва за симптоматично лечение на остри и хронични бронхити и синусити.

ГелоМиртол® форте повлиява секрецията и кашлицата при заболявания на дихателните пътища, втечнява сгъстения секрет, засилва отделянето му, улеснява отхрачването и има противовъзпалителен ефект.

**2. Какво трябва да знаете, преди да използвате ГелоМиртол® форте**

**Не приемайте ГелоМиртол® форте**

- ако имате възпалително заболяване на стомаха, червата или жлъчните пътища,
- или ако имате тежко чернодробно заболяване



- ако сте алергични към активното вещество или някоя от останалите съставки на това лекарство.

Не трябва да давате това лекарство на деца под 10-годишна възраст

#### **Предупреждения и предпазни мерки**

Ако симптомите Ви продължат или се влошат или, ако получите задух или висока температура, ако започнете да изкашляте храчки, които съдържат кръв или гной, трябва незабавно да се консултирате с лекар.

Ако страдате от бронхиална астма, магарешка кашлица или други респираторни заболявания, съпроводени от свръхчувствителност на дихателната система, трябва да приемате това лекарство, само след като сте говорили с Вашия лекар.

#### **Други лекарства и ГелоМиртол® форте**

Няма известни взаимодействия с други лекарства.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

#### **Бременност, кърмене и фертилитет**

Въпреки че липсват съобщения за тератогенен ефект по време на бременност, особено през първото тримесечие, това лекарство може да се прилага само след консултация с лекар.

Поради липофилните свойства на това лекарство, преминаването в кърмата трябва да се счита за много вероятно.

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

#### **Шофиране и работа с машини**

Това лекарство няма влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

#### **ГелоМиртол® форте съдържа сорбитол.**

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете това лекарство.

### **3. Как да приемате ГелоМиртол® форте**

В случай, че не е предписано друго, се прилагат следните препоръки за дозиране:

#### **Възрастни и деца над 10 години:**

При остри случаи приемайте по 1 капсула 3-4 пъти дневно; при хронични заболявания се приема по 1 капсула 2 пъти на ден. Тази дозировка се препоръчва и за поддържаща терапия.

При хронични бронхити за улесняване на сутрешното отхрачване и за по-добър сън се приема 1 капсула допълнително вечер, преди лягане.



Капсулите трябва да се приемат без да се дъвчат ½ час преди хранене с голямо количество хладка течност.

#### **Продължителност на лечението**

Продължителността на лечението с ГелоМиртол® форте зависи от оплакванията. При хронични заболявания на дихателните пътища е възможна по-продължителна терапия.

За лечение на хронични заболявания, продължителността на терапията трябва да бъде обсъдена с лекуващия лекар.

#### **Ако сте приели повече от необходимата доза ГелоМиртол® форте**

Ако сте приели по-голямо количество ГелоМиртол® форте, следните мерки трябва да бъдат предприети от Вашия лекар:

Течен парафин 3ml/kg тегло перорално, промивка на стомаха с 5 % разтвор на натриев бикарбонат, кислородна терапия.

#### **Ако сте пропуснали да приемете ГелоМиртол® форте**

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

#### **4. Възможни нежелани реакции**

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нежеланите реакции са изброени по-долу в низходящ ред според честотата на възникване:

В нечести случаи (могат да засегнат до 1 на 100 човека) могат да възникнат оплаквания в стомашно-чревната област (като стомашна болка/епигастриален дискомфорт) и промяна на вкуса.

Рядко (могат да засегнат до 1 на 1 000 човека) могат да възникнат гадене, повръщане или диария и реакции на свръхчувствителност (например кожен обрив, сърбеж, оток на лицето, задух или нарушения на кръвообращението).

Много рядко (могат да засегнат до 1 на 10 000 човека) може да възникне раздвижване на камъни, съществуващи в бъбреците и жлъчката.

#### **Съобщаване на нежелани реакции**

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата:

ул. „Дамян Груев” № 8  
1303 София  
Тел.: +359 2 8903417



уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg)

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

## **5. Как да съхранявате ГелоМиртол® форте?**

Да се съхранява под 25°C!

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Срокът на годност на продукта е 3 години.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, който е отбелязан върху опаковката.

## **6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация**

### **Какво съдържа ГелоМиртол® форте**

Една стомашно-устойчива мека капсула съдържа:

- 300 mg дестилат от смес от пречистени етерични масла от евкалипт, сладък портокал, мирта и лимон (66:32:1:1)
- Помощни вещества: Рафинирано рапично масло; желатин; глицерол 85 %; сорбитол; хипромелоза ацетат сукцинат; триетил цитрат; натриев лаурилсулфат; талк; декстрин; амониев глициризат.

### **Как изглежда ГелоМиртол® форте и какво съдържа на опаковката**

Една опаковка съдържа 10 стомашно-устойчиви меки капсули.

Една опаковка съдържа 20 стомашно-устойчиви меки капсули.

Една опаковка съдържа 50 стомашно-устойчиви меки капсули.

Една опаковка съдържа 100 стомашно-устойчиви меки капсули.

### **Притежател на разрешението за употреба и производител**

G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG

Kieler Strasse 11

25551 Hohenlockstedt

Германия

### **Дата на последно преразглеждане на листовката**

Март 2021

