

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ДОПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

КИЕТЮД, сироп

QUIETUDE, syrup

Хомеопатичен лекарствен продукт

Листовка - Приложение 2

2002/075

B6/МММ-51679

25.09.2020

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако Вашето дете получи някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че след 3 дни Вашето дете не се чувства по-добре или състоянието му се влоши.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява КИЕТЮД и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди Вашето дете да приеме КИЕТЮД
3. Как да приемате КИЕТЮД
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате КИЕТЮД
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява КИЕТЮД и за какво се използва

КИЕТЮД е хомеопатичен лекарствен продукт, традиционно използван при деца над 1 година при случаи на нервност и при леки нарушения на съня.

Киетюд съдържа шест активни вещества, традиционно използвани при следните симптоми:

- *Chamomilla vulgaris*: раздразнително поведение, гняв, капризно дете
- *Gelsemium*: тревожност, страх от предстоящи събития, емоционален трепор; безсъние
- *Hyoscyamus niger*: нервни, възбудени деца; агресивно поведение; безсъние, нощна уплаха
- *Kalium bromatum*: безсъние и нощни страхове
- *Passiflora incarnata*: леки симптоми на психически стрес и за подпомагане на съня
- *Stramonium*: психомоторна възбуда; безсъние поради нощни страхове; безсъние от страх от тъмнината

2. Какво трябва да знаете, преди Вашето дете да приеме КИЕТЮД

Не приемайте КИЕТЮД

- ако Вашето дете е алергично (свръхчувствително) към активните вещества или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Курсът на лечение трябва да бъде толкова кратък, колкото е възможно, и трябва да се прекрати след изчезването на симптомите. Ако симптомите не се повлият след три дни лечение, консултирайте се с Вашия лекар.

Предупреждения и предпазни мерки

Ако Вашият лекар Ви е казал, че Вашето дете има непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да дадете този лекарствен продукт.

Лекарствен продукт за деца над 12 месечна възраст.

Това лекарство изисква медицински съвет преди приемане от деца на възраст между 12 и 30 месеца.



Причините за нарушения на съня при деца изискват консултация с лекар. Необходимо е да се потърси и установи причината за нарушението на съня.

Други лекарства и Киетюд

Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако Вашето дете приема, накърно е приемало или е възможно да приема други лекарства, включително и такива, отпусканi без рецептa.

КИЕТЮД с храни и напитки

Този лекарствен продукт трябва да се приема между храненията.

Бременност, кърмене и фертилитет

Не е свързано с това лекарство, защото се използва при деца.

Шофиране и работа с машини

Няма наблюдавано въздействие върху способността за шофиране и работа с машини.

Киетюд сироп е предназначен за деца.

КИЕТЮД съдържа захароза, етанол 96 % и бензоена киселина.

Това лекарство съдържа 3,94 g захароза в 5 ml сироп. Това трябва да се има предвид при пациенти със захарен диабет.

Това лекарство съдържа 15 mg етанол в 5 ml сироп. Количество в 5 ml от това лекарство е еквивалентно на по-малко от 0,4 ml бира или 0,2 ml вино.

Малкото количество алкохол в това лекарство няма да има някакъв забележим ефект.

Това лекарство съдържа 5,53 mg бензоена киселина в 5 ml сироп.

3. Как да приемате Киетюд

Перорално приложение.

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Лекарствен продукт за деца над 12 месечна възраст.

При деца на възраст 12 до 30 месеца трябва да се дава само след консултация с лекар.

Препоръчителна доза

При преходна нервност и при леки нарушения на съня: да се взима по 1 доза от 5 ml от сиропа, измерена с мерителна чашка, сутрин и вечер.

Курсът на лечение трябва да се прекрати веднага след изчезване на симптомите и трябва да бъде възможно най-кратък. Ако симптомите продължават, лечението трябва да се преоценi.

Курсът на лечение не трябва да надвишава 10 дни при деца над 30 месечна възраст.

Ако Вашето дете е приело повече от необходимата доза КИЕТЮД

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт.


Ако сте пропуснали да дадете КИЕТЮД на Вашето дете

Не давайте на детето двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на КИЕТЮД

Попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.



4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, КИЕТЮД може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Не са наблюдавани нежелани реакции.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно на

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

тел.: +35928903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Киетюд

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте КИЕТЮД след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.

Не използвайте КИЕТЮД повече от 6 месеца след първоначалното отваряне на бутилката.

Този лекарствен продукт не изисква специални условия за съхранение.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа КИЕТЮД

За 100 g:

- Активните вещества са:

CHAMOMILLA VULGARIS	9CH.....	1.5 g
GELSEMIUM	9CH.....	1.5 g
HYOSCYAMUS NIGER	9CH.....	1.5 g
KALIUM BROMATUM	9CH.....	1.5 g
PASSIFLORA INCARNATA	3DH	1.5 g
STRAMONIUM	9CH.....	1.5 g

- Другите съставки са:

Захароза, етанол 96%, бензоена киселина, карамел, вода.

Как изглежда КИЕТЮД и какво съдържа опаковката

Сироп в бутилка от 200 ml с мерителна чашка.

Притежател на разрешението за употреба и производител

BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Франция

Дата на последно преразглеждане на листовката

{ММ/ГГГГ г.}

