

Листовка: информация за

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВОТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. № 20100007	
Разрешение № BG/МАТ/МР-52096	
	19.10.2020
СТОДАЛ ПОКЕТ, пилули	Съобрение №
STODAL POCKET, pilules	

СТОДАЛ ПОКЕТ, пилули
STODAL POCKET, pilules

Хомеопатичен лекарствен продукт

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
 - Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
 - Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява СТОДАЛ ПОКЕТ, пилули и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете СТОДАЛ ПОКЕТ, пилули
3. Как да приемате СТОДАЛ ПОКЕТ, пилули
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате СТОДАЛ ПОКЕТ, пилули
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява СТОДАЛ ПОКЕТ, пилули и за какво се използва

СТОДАЛ ПОКЕТ, пилули е хомеопатичен лекарствен продукт, използван за симптоматично лечение на кашлица от различен произход. Съдържа осем активни вещества, традиционно използвани при следните симптоми на суха и влажна кашлица:

Antimonium tartaricum при влажна кашлица със затруднено дишане (диспнея) и труден за отхрачване гъст секрет;

Bryonia при суха и болезнена кашлица, срещаща се при трахеити и бронхити, влошаваща се при най-малкото движение;

Coccus cacti при пристъпна кашлица, провокирана от ларингеално дразнене с отхрачване на вискозен точещ се секрет, предимно нощна и на разсъмване;

Drosera при пристъпна спастична кашлица с нощно обостряне, често придружена с гърдни и абдоминални болки;

Ipeca при спастична задушаваща кашлица, придружена от гадене и повръщане;

Rumex crispus при неспирна, суха и уморителна кашлица, предизвикана от ларингеално и/или трахеално дразнене;

Spongia tosta при суха ларингеална кашлица, дрезгава и задушаваща, често влошаваща се през нощта;

Sticta pulmonaria при суха, дразнеща, неспирна и уморителна, често нощна кашлица, влошаваща се при дълбоко вдишване.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете СТОДАЛ ПОКЕТ, пилули

Не приемайте СТОДАЛ ПОКЕТ, пилули

Ако сте алергични (свръхчувствителни) към активните вещества или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки



За деца под 18 месеца разтворете пилулите в малко количество вода.

Други лекарства и СТОДАЛ ПОКЕТ, пилули

Не се очаква взаимодействие.

СТОДАЛ ПОКЕТ, пилули с храна и напитки

Този хомеопатичен лекарствен продукт трябва да се приема в различно време от храненето. Въпреки това, не се очаква специфично взаимодействие с храни и напитки.

Бременност, кърмене и фертилитет

Това лекарство може да се използва по време на бременност и кърмене.

Шофиране и работа с машини

Не се очакват ефекти върху способността за шофиране и работа с машини.

СТОДАЛ ПОКЕТ, пилули съдържа захароза и лактоза.

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него преди да приемете този лекарствен продукт.

3. Как да приемате СТОДАЛ ПОКЕТ, пилули

Дозировка и начин на приложение

Перорално приложение.

По 5 пилули на всеки час.

За възрастни и деца над 18 месеца се оставят да се разтопят под езика.

За деца под 18 месеца се разтварят в малко количество вода.

Ако сте приели повече от необходимата доза СТОДАЛ ПОКЕТ, пилули

Не се очаква риск в случай на предозиране.

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да приемете СТОДАЛ ПОКЕТ, пилули

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

4. Възможни нежелани реакции

Не се очакват нежелани реакции.

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции.

Можете също да съобщите нежелани реакции директно на

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

тел.: +35928903417

уебсайт: www.bda.bg



Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате СТОДАЛ ПОКЕТ, пилули

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа СТОДАЛ ПОКЕТ, пилули

Активни вещества за 4 g:

ANTIMONIUM TARTARICUM	6 CH	0,005 ml
BRYONIA	3 CH	0,005 ml
COCCUS CACTI	4 CH	0,005 ml
DROSERA	3 CH	0,005 ml
IPECA	3 CH	0,005 ml
RUMEX CRISPUS	6 CH	0,005 ml
SPONGIA TOSTA	4 CH	0,005 ml
STICTA PULMONARIA	3 CH	0,005 ml

Другите съставки са:

захароза, лактоза.

Как изглежда СТОДАЛ ПОКЕТ, пилули и какво съдържа опаковката

Този лекарствен продукт се предлага под формата на бели до почти бели сферични пилули, поставени в туба от PP с интегриран дозатор за пилули и капачка от PS, по две туби (от 4g) в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба и производител

BOIRON

2 Avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Франция

Дата на последно преразглеждане на листовката {ММ/ГГГГ}

