

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. №	9600051
Разрешение №	B6/MK/Myb-570B
Одобрение №	31.03.2021

КОКУЛИН, таблетки
COCCULINE, tablets
Хомеопатичен лекарствен продукт

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Трябва да потърсите лекарска помощ ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява **КОКУЛИН, таблетки** и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете **КОКУЛИН, таблетки**
3. Как да приемате **КОКУЛИН, таблетки**
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате **КОКУЛИН, таблетки**
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КОКУЛИН, таблетки И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

КОКУЛИН таблетки е хомеопатичен лекарствен продукт използван за:

- Профилактика и лечение на прилошаване при пътуване: морска болест, въздушна болест, прилошаване в кола.
- Лечение на гадене и повръщане без повишена температура.

КОКУЛИН съдържа четири активни вещества традиционно използвани при следните симптоми:

- *Cocculus indicus*: прилошаване при пътуване, гадене и повръщане при бременност, гадене и виене на свят при мигрена.
- *Nux vomica*: прилошаване при пътуване, гадене облекчаващо се след повръщане; при злоупотреба с храна и алкохол; гадене и повръщане при бременност.
- *Tabacum*: прилошаване при пътуване, гадене, гадене и повръщане при бременност.
- *Petroleum*: прилошаване при пътуване, сутрешно гадене, гадене със световъртеж при мигрена, гадене при бременност.

2. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ, ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕТЕ КОКУЛИН, таблетки

Не приемайте КОКУЛИН, таблетки

Ако сте алергични (свръхчувствителни) към активните вещества или към някоя от останалите съставки на **КОКУЛИН, таблетки** (изброени в точка 6).

Обърнете специално внимание при употребата на КОКУЛИН, таблетки

Ако Вашият лекар Ви е информирал, че имате непоносимост към някои видове захари, свържете се с него преди да приемете това лекарство.

Употреба на други лекарства

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.



Прием на КОКУЛИН, таблетки с храна, напитки и алкохол
Този лекарствен продукт трябва да се приема между храненията.

Бременност, кърмене и фертилитет

Този лекарствен продукт може да се използва по време на бременност и кърмене и не оказва влияние върху фертилитета.

Шофиране и работа с машини

Няма наблюдавано въздействие върху способността за шофиране и работа с машини.

Важна информация относно някои от съставките на КОКУЛИН, таблетки

Списък на помощните вещества с доказан ефект: лактоза, захароза.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ КОКУЛИН, таблетки

За перорално приложение.

Таблетките се държат в устата до пълното им разтваряне.

При прилошаване при пътуване:

- Профилактично: по 2 таблетки 3 пъти дневно в деня преди пътуването и в деня на пътуването.
- С лечебна цел: по 2 таблетки на всеки час при появяване на симптомите. Приемът се повтаря при нужда.

При гадене и повръщане без повишена температура:

За деца под 24 месеца се консултирайте с лекар, преди да приемат лекарството.

- При първите симптоми: по 1 таблетка при всяко гадене и/или повръщане. Приемите се разреждат при подобрене. Приемът се спира когато симптомите изчезнат.

Да не се приемат повече от 6 таблетки на ден. Лечението не трябва да надвишава 48 часа без лекарска консултация.

Ако симптомите продължават или се влошават трябва да потърсите лекарска помощ.

Деца под 6 години: таблетките се стриват и разтварят във вода преди прием.

Ако сте приели повече от необходимата доза КОКУЛИН, таблетки

Не се очаква особен риск в случай на предозиране.

Ако сте пропуснали да приемете КОКУЛИН, таблетки

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на КОКУЛИН, таблетки

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този лекарствен продукт, моля, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, КОКУЛИН, таблетки, може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Не са наблюдавани нежелани реакции.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

тел.: +35928903417



уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ КОКУЛИН, таблетки

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте КОКУЛИН, таблетки, след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

6. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа КОКУЛИН, таблетки

Всяка една таблетка съдържа активните вещества:

Cocculus indicus 4 СН	0.375 mg
Nux vomica 4 СН	0.375 mg
Tabacum 4 СН.....	0.375 mg
Petroleum 4 СН	0.375 mg

Другите съставки са: лактоза, захароза, магнезиев стеарат.

Как изглежда КОКУЛИН, таблетки, и какво съдържа опаковката

Бели кръгли двойноизпъкнали таблетки, поставени в блистери от PVC/Al фолио.

Притежател на разрешението за употреба и производител

VOIRON
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy
Франция

Дата на последно преразглеждане на листовката
02.2021 г.

ЗДРАВНИ СЪВЕТИ

Гаденето и повръщането са често срещани симптоми. Те са израз на защитна реакция на организма. Обикновено изчезват за 1 до 2 дни, при спазване на прости хигиенни норми. В случай на повръщане е необходимо да се мисли за приемане на течности, много, често, солени или сладки напитки, за да се компенсира загубата на течности от повръщането.

Въпреки това:

- Ако се появят други нарушения (болка и/или повишена телесна температура).
- Ако повръщането е придружено от жлъчка или кръв.
- Ако гаденето и повръщането продължават повече от 48 часа, въпреки лечението.
- Ако гаденето и повръщането се влошават.

КОНСУЛТИРАТЕ СЕ С ВАШИЯ ЛЕКАР

