

**Състав**

100 g сироп съдържат:

Лекарствени вещества: Thymi folium extr. fluidum (1:1) - 7,53 g.

Plantaginis folium extr. fluidum (1:1) - 7,53 g, extr. solvent Ethanol 96 %.

Помощи вещества: захароза, карамел, глицерол, консервант и др.

**Лекарствена форма**

Сироп

**Притежател на разрешението за употреба и производител**  
Pharm. Fabrik Montavit Ges.m.b.H, A-6060, Absam/Tirol, Austria

**Фармацевтична и терапевтична група и механизъм на действие:**

Тусавит сироп облекчава кашлицата, улеснява отхрачването на бронхиалния секрет и дишането, подобрява общото Ви състояние. Тусавит сироп е лекарствен продукт, включващ течни екстракти от листата на Теснолист Живовляк и Машерка, които притежават муколитичен, отхрачващ и спазмолитичен ефекти върху горните дихателни пътища и лигавицата на устната кухина. Течния екстракт от Машерка подпомага втъчняването на прилепналия мукос и улеснява отделянето му. Течния екстракт от Живовляк притежава антимикробна активност, противовъзпалително действие и се използва традиционно при лечение на катари на дихателните пътища и възпалителни изменения на мукозните мембрани на устата и фаринга.

**Показания**

Растителен лекарствен продукт, експекторант, за облекчаване на кашлицата при катари на горните дихателни пътища, при грипни инфекции и възпаление на лигавицата на устната кухина и фаринга.



**Дозировка, начин и продължителност на употреба**

**Възрастни и деца над 12 год.:** 1-2 чаени лъжички (15-30 ml) до 6 пъти дневно.

**Деца 6-12 год.:** 1 чаена лъжичка 3-6 пъти дневно.

**Деца 2-6 год.:** 1 чаена лъжичка 2-3 пъти дневно.

Тусавит сироп е с по-голям ефект ако се приема поне половин час пред или след хранене.



**Противопоказания**

Свръхчувствителност към някоя от съставките.

Кърмачета и деца под 2 год.



**Бременност и кърмене**

Употребата по време на бременност и кърмене е позволена.

**Специални предупреждения**

Този лекарствен продукт съдържа малко количество етанол (алкохол) около 0,2 g в една чаена лъжичка и не трябва да се приема от алкохолици. Една чаена лъжичка съдържа също и 2,8 g захароза (захар), това трябва да се вземе в предвид и да не се приема от пациенти с диабет. Ако знаете, че имате нетolerантност към някои видове захари, консултирайте се с лекар преди употребата на този лекарствен продукт.

**Предпазни мерки при употреба**

При продължаване на оплакванията или ако очаквания резултат не се постига, е необходима лекарска консултация.

**Съхранение**

Съхранява се на място, недостъпно за деца. Срок на годност след първоначално отваряне на опаковката: 4 седмици. Без специални условия на съхранение.

**Взаимодействия**

Не са известни досега.

**Нежелани реакции**

При употребата според указанията, не са известни нежелани реакции. Реакциите на свръхчувствителност не са изключени напълно.



**Големина на опаковката**

125 g, 250 g

**Дата на изтичане/срок на годност**

Да не се използва след изтичане/срок на годност, означен върху опаковката.

**Дата на последна/частична/редакция на листовката**

Декември 2006 година