

110101

ЛИСТОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ



Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за вас информация.

Винаги използвайте ФЕНИСТИЛ ГЕЛ така, както е описано в тази листовка или както Вие е посъветвал Вашият фармацевт. Трябва да се консултирате с Вашия лекар или фармацевт, ако имате някакви съмнения.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствените продукти.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново. Тази листовка се осъвременява регулярно с актуалната информация за вашето лекарство. Моля, погледнете датата на последното осъвременяване в края на листовката.
- Ако се нуждате от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват след 7-дневно лечение.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява ФЕНИСТИЛ ГЕЛ и за какво се използва
2. Преди да прилагате ФЕНИСТИЛ ГЕЛ
3. Как да използвате ФЕНИСТИЛ ГЕЛ
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ФЕНИСТИЛ ГЕЛ
6. Допълнителна информация

1. НАЧОВО ПРЕДСТАВЛЯВА ФЕНИСТИЛ ГЕЛ И ЗА КАКОВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Какво представлява ФЕНИСТИЛ ГЕЛ

ФЕНИСТИЛ ГЕЛ съдържа активна съставка, която принадлежи към групата медикаменти, наречени антихистамини. Те се използват за облекчаване на кожни алергии и различни видове сърбеж.

За какво се използва ФЕНИСТИЛ ГЕЛ

ФЕНИСТИЛ ГЕЛ се използва за облекчаване на сърбежа, предизвикан от кожни реакции като зачервяване, обриви, ухапвания от насекоми, слънчево изгаряне или повърхностни изгаряния.

ФЕНИСТИЛ ГЕЛ намалява сърбежа, като блокира действието на хистамина – вещество, което се освобождава в организма по време на алергична реакция. Тъй като ФЕНИСТИЛ ГЕЛ проника добре през кожата сърбенът и кожното раздразнение намаляват бързо в рамките на няколко минути. ФЕНИСТИЛ ГЕЛ има и локален анестетичен ефект.

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ФЕНИСТИЛ ГЕЛ

Не използвайте ФЕНИСТИЛ ГЕЛ

- ако сте алергични към диметиндено малеат или към някоя от останалите съставки на ФЕНИСТИЛ ГЕЛ (вж. т. 6 и т. 2). Ако не сте сигури, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако някое от тези неща се отнася за Вас, не използвайте ФЕНИСТИЛ ГЕЛ.

Обрънете специално внимание при употребата на ФЕНИСТИЛ ГЕЛ

- Избягайте продължителното излагане на слънце на големи повърхности на тялото, върху които е приложен гелът.
- Информирайте Вашия лекар, ако се касае за много силен сърбеж или обширно засягане на кожата.

Ако имате някакви въпроси, говорете с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на ФЕНИСТИЛ ГЕЛ.

Деца

При кърмачета и малки деца не употребявайте ФЕНИСТИЛ ГЕЛ върху обширни площи наранени или възпалена кожа.

Употреба на други лекарства

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпусканни без рецептa.

Бременност и кърмене

По време на бременност и кърмене не използвайте ФЕНИСТИЛ ГЕЛ върху големи кожни повърхности, особено ако са наранени или възпалени. Не слагайте гел върху зърната, ако кърмите.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Прилагането на ФЕНИСТИЛ ГЕЛ върху кожата не влияе върху способността за шофиране и работа с машини.

Допълнителна информация относно пъкот от съставките на ФЕНИСТИЛ ГЕЛ

ФЕНИСТИЛ ГЕЛ съдържа:

- пропилен гликол - може да предизвика слабо локализирано дразнение на кожата;
- бензалкониев хлорид - дразнено вещество, може да причини кожни реакции.

3. НАЧАДА ИЗПОЛЗВАТЕ ФЕНИСТИЛ ГЕЛ

Употребявайте ФЕНИСТИЛ ГЕЛ, както е описано в листовката на продукта или както Вие е посъветвал Вашият фармацевт. Може да се консултирате с Вашия лекар или фармацевт, ако не сте сигури в употребата на този продукт.

Нанасяйте 2 до 4 пъти дневно върху засегнатите места.
Консултирайте се с Вашия лекар, ако симптомите не се подобрят в рамките на една седмица.

**Ако сте използвали повече от необходимата доза
ФЕНИСТИЛ ГЕЛ**

Ако Вие или дете случайното погълнете това лекарство,
независимо се свържете с Вашия лекар.

Ако имате допълнителни въпроси за употребата на
ФЕНИСТИЛ ГЕЛ, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, ФЕНИСТИЛ ГЕЛ може да предизвика
нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нечести нежелани лекарствени реакции (могат да се
проявят при 1 до 10 на всеки 1000 человека).

- Кожна сухота, усещане за парене на кожата.

Много редки нежелани лекарствени реакции (могат да се
проявят при по-малко от 1 на всеки 10 000 человека).

- Алергична кожна реакция, включваща обрив и сърбек.

Спрете употребата и се консултирайте с Вашия лекар,
ако се появява кожна реакция или последната се
задълбочи.

Ако някога от нежеланите лекарствени реакции стане
сериизна или забележите други, неописани в тази
листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия
лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ФЕНИСТИЛ ГЕЛ

- Съхранявайте ФЕНИСТИЛ ГЕЛ на място, недостъпно за
деца.
- Не използвайте ФЕНИСТИЛ ГЕЛ след срока на годност,
отбелзан върху картонената опаковка и тубата. Срокът
на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
- Да се съхранява под 25 °C.
- Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията
или в контейнера за домашни отпадъци. Политайте
Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви
лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на
околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа ФЕНИСТИЛ ГЕЛ

Активното вещество е диметинденов малеат. Всеки грам от
този гел съдържа 1 mg диметинденов малеат.

Помощни вещества: бензалкониев хлорид, динатриев
едетат, карбомер, пропилен гликол, натриев хидроксид,
пречистена вода.

**Как изглежда ФЕНИСТИЛ ГЕЛ и какво съдържа
опаковката**

ФЕНИСТИЛ ГЕЛ представлява охлаждащ, безцветен и без
мирис, неомазняващ гел в туба от 30 g. Не зацепва дрехите.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Novartis Consumer Health GmbH, Zielstrasse 40, 81379
München, Германия

За допълнителна информация относно този лекарствен
продукт, моля, свържете се с уполномочения представител
на притежателя на разрешението за употреба за България/
вносител:

Салвис Фарма ООД,
1528 София, ул. Димитър Пешев
тел. +359/882532901

Дата на последно одобрение на листовката

Август 2011



BG 145624 - BG 908165

 NOVARTIS