

11 00 15

SOLPADEINE* SOLUBLE

500mg/8mg/30mg soluble tablets paracetamol/codeine/caffeine
СОЛПАДЕИН разтворими таблетки
500mg/8mg/30mg разтворими таблетки парациетамол/кодеин/кофеин

Прочетете внимателно цялата тази листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждате от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СОЛПАДЕИН Разтворими таблетки ИЗ КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?

СОЛПАДЕИН съдържа три активни съставки: парациетамол – аналгетик (спокойнота болката) и антипиретик (понижава температурата), кодеин – аналгетик и кофеин, който засилва обезблъскващото действие. СОЛПАДЕИН се препоръчва за бързо облегчаване на слаб до средно изразена болка (ревматична болка, главоболие, мигrena, невралгия, зъбобол, възпалено гърло, болка при синусит и стоматологични интервенции, например екстракция на зъб, менструални и мускулни болки), за повлияване на високата температура и другите симптоми при простуда и грип.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМАТЕ СОЛПАДЕИН Разтворими таблетки

Запомните: Съдържа парациетамол.

Не приемайте други лекарства, съдържащи парациетамол.
Не взимайте СОЛПАДЕИН, ако сте алергични към парациетамол, кодеин и кофеин или някои от другите съставки, посочени по-долу.

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди да вземете СОЛПАДЕИН, ако:

- имате бъбречно или чернодробно заболяване;
- страдате от хипертрофия (уголемяване) на простатата;
- имате тежко възпаление или запушване на червата;

- сте бременна или кърмите;
- имате заболявания на дихателната система, противачи със задух;
- взимате лекарства, предписани Ви за депресия, или други лекарства, влияещи на централната нервна система, напр. седативни и сънотворни;
- взимате метоклопрамид, домперидон (използван за понижаване на гадене и повръщане) или холестири胺; прилаган за понижаване нивото на холестерола;
- взимате антикоагуланти – лекарства, използвани за разреждане на кръвта;
- сте на ниско солева диета, защото всяка таблетка съдържа 398mg натрий (796mg натрий за доза от две таблетки);
- страдате от вродена неподносимост към фруктоза, имате глюкозен/галактозен синдром на малаборбция или захарно/изомалтозен дефицит поради съдържанието на 50mg сорбитол (E420) във всяка таблетка.

Това лекарство съдържа кофеин. Избивайте приемането на големи количества чай, кафе или кофеин съдържащи напитки докато приемате СОЛПАДЕИН. Повишеният прием на кофеин може да Ви направи раздразнителни и напрегнати, да имате проблеми със съня или да изпитвате неприятно чувство на стягане и тежест във върхурите.

Бременност и кърмене

Комбинацията парациетамол/кодеин/кофеин не се препоръчва по време на бременност. Наличните данни не показват, че парациетамол е противопоказан по време на кърмене. Кофеин се излъчува в майчиното мляко и може да има стимулиращ ефект върху кърмачето, но токсични концентрации не са наблюдавани.

Кърмещите жени трябва да наблюдават бебето си по време на лечението за възможна повка на повишенна сънливост, отпуснатост, затруднено сучене или дишане, намален тонус. При повка на подобни симптоми е необходимо веднага да се потърси лекарска помощ.

Не използвайте СОЛПАДЕИН или друг кодеин съдържащ продукт по време на кърмене освен при препоръка на лекар. Употребата на подобни продукти може да навреди на бебето Ви.

Влияние върху способността за шофиране и работа с машини

Солпаден може да причини виене на свят. Ако почувствате замайване, не карайте кола и не работете с машини.

3. КАК ДА СЕ ПРИЕМА СОЛПАДЕИН Разтворими таблетки?

40L165E

За перорално приложение.

Възрастни, включително и тези над 60 години, и деца на и над 12 години: Една до две таблетки, разтворени в не по-малко от половин чаша с вода, до четири пъти на ден при необходимост.

Дозата да не се взима на интервали, по-кратки от 4 часа.

Възрастни: Да не се взимат повече от 8 таблетки за 24 часа.

Деца на и над 12 г.: Да не се взимат повече от 6 таблетки за 24 часа.

Деца под 12 години: Не се препоръчва при деца под 12 години.

Да не се надвишава препоръчаната доза. Да не се приема повече от 10 дни без консултация с лекар. Ако симптомите се запазят повече от 3 дни, консултирайте се с Вашия лекар.

Какво трябва да направите, ако приемете прекалено много?

Ако вземете повече от препоръчаната доза, незабавно потърсете лекарска помощ, дори и да се чувствате добре. Предозирането с парацетамол може да причини увреждане на черния дроб.

Съдържа кодеин, редовната употреба за дълъг период от време може да доведе до симптоми като безспокойство и раздразнителност когато се спре приема на това лекарство. Ако се налага да приемате това лекарство за по-дълъг период от време се консултирайте с Вашия лекар.

Какво трябва да направите ако забравите или сте пропуснали да приемете необходимата доза?

Приемете дозата когато си спомнете. Не приемайте двойна доза за да компенсирате пропуснатата.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

При парацетамол, нежеланите реакции са редки. Може да се наблюдават алергични реакции, напр. кожен обрив. Спрете приема на лекарството и се консултирайте с Вашия лекар, ако:

- наблюдавате алергична реакция като сърбек, обрив, проблеми с дишането, покъване от оточните, езика, гърлото или лицето;
- се появят язви в устата;
- сте имали проблеми с дишането при употреба на ацетилсалцилкова киселина или нестероидни противовъзпалителни лекарства;
- имате неочаквано кървене или склонност към насищаване.

Кодени може да причини залек, гадение, виене на съят или сънливост, но тези нежелани реакции се наблюдават много рядко при приемане на препоръчаните дози. Най-често наблюдаваните при кофеин нежелани

реакции са: гадение, поради гастро-интестинално дразнене, бързане и безспокойство з резултат на стимулиране на централната нервна система. Консултирайте се с Вашия лекар, ако наблюдавате никакви неочаквани реакции.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА СОЛПАДЕИН Растворими таблетки

Да се пази на места, недостъпни за деца.

Да се съхранява при температура под 25°C.

Не използвайте след датата, посочена на опаковката.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа СОЛПАДЕИН?

Всяка таблетка съдържа:

- парацетамол 500mg
- кодеин фосфат 8mg
- кофеин 33mg

Таблетката съдържа също така натриев бикарбонат, сорбитол (E420), натриев захарин, натриев лаурил сулфат, лимонена киселина, натриев карбонат, поливидон, течен силикон и пречистена вода.

Как изглежда СОЛПАДЕИН Растворими таблетки и какво съдържа опаковката?

СОЛПАДЕИН Растворими таблетки са бели, кръгли таблетки с делителна черта от едната страна, опаковани в ламинирана двусловна лента.

Картонената опаковка може да съдържа 12, 24, 48 или 96 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба е:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

GlaxoSmithKline Export Ltd.

Brentford, TW8 9GS, Великобритания

Производител е:

GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd.,

Knockbrack, Dungarvan Co. Waterford, Ирландия

Срок на годност – 4 години

Без лекарско предписание. Условията за актуализация – септември 2009

 GSK GlaxoSmithKline

Solpadeine® е търговска марка на GlaxoSmithKline group of companies.

40L165E

