



150038

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

Уважаеми пациенти, моля прочетете внимателно тази листовка, защото тя съдържа важна за Вас информация. Ако имате допълнителни въпроси, обърнете се към лекуващия лекар.

## ДЕНТОКИНД ТАБЛЕТКИ

Dentokind® tablets

### Активни вещества:

Belladonna (Беладона) trit. D6, Chamomilla (Хамомила) trit. D6, Ferrum phosphoricum (Ферум фосфорикум) trit. D6, Hepar sulfuris (Хепар сулфурис) trit. D12, Pulsatilla (Пулсатила) trit. D6.

### Какво представлява Дентокинд?

Дентокинд е хомеопатичен лекарствен продукт.

### За какво се използва Дентокинд?

Дентокинд се използва при оплаквания при поникване на зъби при кърмачета и малки деца.

### Кога не трябва да се приема Дентокинд?

Да не се приема от пациенти, които са свръхчувствителни към някоя от съставките на продукта.

### Какви предпазни мерки трябва да имате предвид при приемането на Дентокинд?

Ако не се наблюдава подобрение или оплакванията се повтарят често, моля, посъветвайте се с лекуващия лекар.

Да не се използва продължително време без консултация с лекар.

### Кои други лекарства могат да повлияят ефекта на Дентокинд или могат да бъдат повлияни?

Няма данни за взаимодействия с други лекарства или с храни. Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако вашето дете приема или доскоро е приемало друг лекарствен продукт, дори и ако той не е по лекарско предписание.

### Как можете да използвате Дентокинд?

Следвайте посочената дозировка или както е изписано от Вашия лекар:

Деца до 1 година: При остри оплаквания се приема по една таблетка на всеки час до максимум 6 таблетки дневно. След отшумяване на оплакванията – по 1 таблетка 3 пъти дневно.

Деца от 1 до 6 години: При остри оплаквания се приемат по 2 таблетки на всеки час до максимум 12 таблетки дневно. След отшумяване на оплакванията – по 2 таблетки 3 пъти дневно.

Таблетките се приемат половин час преди или след хранене и се оставят да се разтопят бавно в устата. За малки деца таблетките да се разтварят в малко вода.

### Какви нежелани лекарствени реакции могат да бъдат причинени от Дентокинд?

Възможни са прояви на свръхчувствителност.

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако подозирате, че Вашето дете проявява нежелана лекарствена реакция след прием на Дентокинд.

### Какво трябва да предприемете, ако Вашето дете приеме по-голямо количество от Дентокинд?

Не се очакват никакви нежелани лекарствени реакции при прием на по-голямо количество от Дентокинд.

### Срок на годност:

5 години.

Да не се използва след изтичане срока на годност, отбелязан върху опаковката.



**Инструкции за съхранение на Дентокинд:**

Да се съхранява при температура под 25 °C!

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

**Състав:**

1 таблетка съдържа:

Активни вещества:

Belladonna (Беладона) trit. D6 15 mg, Chamomilla (Хамомила) trit. D6 15 mg, Ferrum phosphoricum (Ферум фосфорикум) trit. D6 15 mg, Hepar sulfuris (Хепар сулфурис) trit. D12 15 mg, Pulsatilla (Пулсатила) trit. D6 15 mg

Помощни вещества:

Микрокристална целулоза, талк, лактоза монохидрат, магнезиев стеарат

**Данни за опаковката:**

Бутилка от кафяво стъкло, с пластмасова капачка.

150 таблетки в опаковка.

**Производител и притежател на разрешението за употреба:**

Deutsche Homöopathie-Union,  
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG  
Ottostrasse 24  
76227 Karlsruhe  
Германия

**Медицинско представителство:**

Алпен Фарма ООД  
Офис 12А, ул. Д-р  
Йордан Йосифов 8,  
София 1700, България

**Дата на последна поправка на текста:**

Август 2010

