

110034

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

**COLDREX\* MaxGrip Lemon** 1000mg/10mg/40mg  
powder for oral solution  
paracetamol/phenylephrine hydrochloride/ascorbic acid

**КОЛДРЕКС\* МаксГрип Лимон** 1000mg/10mg/40mg  
прах за перорален разтвор  
парацетамол/фенилефрин хидрохлорид/аскорбинова киселина

Прочетете внимателно цялата тази листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

**1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КОЛДРЕКС МаксГрип Лимон И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?**

КОЛДРЕКС МаксГрип Лимон е лекарствен продукт за облекчаване на симптомите при настинка и грип при възрастни и съдържа три активни съставки:

- **парацетамол**, който облекчава болката и понижава високата температура;
- **фенилефрин хидрохлорид**, деконгестант, който отпушва носа и синусите, помагайки Ви да дишате по-леко;
- **витамин С** (аскорбинова киселина), който се прилага при грип и настинки поради повишените нужди на организма, особено в началния стадий на заболяването.

**2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМАТЕ КОЛДРЕКС МаксГрип Лимон**

КОЛДРЕКС МаксГрип Лимон съдържа **парацетамол** и **деконгестант**.

Да не се приема с други парацетамол – съдържащи лекарства или лекарства за настинка и грип.

Не приемайте КОЛДРЕКС МаксГрип Лимон, ако:

- сте **алергични** (свръхчувствителни) към парацетамол, фенилефрин хидрохлорид, витамин С или някое от помощните вещества;
- сте на лечение с **антидепресанти**, като инхибитори на моноаминооксидазата;
- **Посъветвайте се с Вашия лекар**, ако някое от гореизброените се отнася до Вас или:
- имате **чернодробно или бъбречно заболяване**;
- имате **хипертония, сърдечно заболяване, съдово заболяване** (болест на Рейно), което се появява като болка в пръстите;
- сте **диабетик**. Всяко саше съдържа 3,725g захар;
- страдате от **повишена функция на щитовидната жлеза**;
- имате **глаукома**;
- имате проблеми с простатата и/или трудно уриниране;
- приемате **други лекарства** (виж по-надолу);
- страдате от **вродена непоносимост към фруктоза, глюкозен/галактозен синдром на малабсорбция или захарно/изомалтозен дефицит**.

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да вземете Колдрекс МаксГрип Лимон ако приемате:

- други лекарства, съдържащи **парацетамол**;
- други лекарства, съдържащи **деконгестант** или за настинка;
- **варфарин** или лекарства, използване за разреждане на кръвта;
- **бета-блокери**, използвани за сърдечни заболявания и високо кръвно налягане;
- **дигоксин**;
- средства за подтискане или стимулиране на апетита;
- лекарства за лечение на депресия като трициклически антидепресанти (напр. амитриптилин).

Кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате тези или някакви други лекарства, включително растителни или лекарства без рецепта.

**Бременност и кърмене**

Лекарството не се препоръчва по време на бременност.

Ако кърмите се посъветвайте с Вашия лекар или фармацевт преди да приемате КОЛДРЕКС МаксГрип Лимон.

**Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини**

Ефектът на КОЛДРЕКС МаксГрип Лимон върху способността за шофиране и работа с машини е незначителен, ако такъв въобще се наблюдава.

**3. КАК ДА СЕ ПРИЕМА КОЛДРЕКС МаксГрип Лимон?**

**За перорално приложение.**

Обичайната доза за възрастни (включително в старческа възраст) и деца на и над 12 години е едно саше на всеки 4 или 6 часа при необходимост.

11000000008322





Не взимайте повече от 4 (четири) сашета за период от 24 часа.

Да не се приема повече от 7 (седем) дни.

Да не се дава на деца под 12 години.

**КОЛДРЕКС МаксГрип Лимон се приема под формата на топла напитка.**

1. Изсипете съдържанието на едно саше в чаша, добавете топла вода (около 125ml) и разбъркайте добре.

2. Ако е необходимо добавете студена вода.

3. Ако предпочитате добавете захар или мед.

Ако високата температура продължи повече от 3 дни, а другите симптоми – повече от 5 дни се

консултирайте с Вашия лекар и спрете приема на КОЛДРЕКС МаксГрип Лимон.

Не надвишавайте посочената доза.

**Какво трябва да направите ако приемете прекалено голямо количество?**

Ако вземете повече от препоръчаната доза **незабавно потърсете лекарска помощ** и кажете точното количество, което сте приели. Предозирането с парацетамол може да причини увреждане на черния дроб.

**Какво трябва да направите ако забравите да приемете необходимата доза?**

Приемете дозата КОЛДРЕКС МаксГрип Лимон, когато си спомните.

Не взимайте повече от една доза на всеки 4 часа. Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

#### 4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както при всички лекарства, така и при КОЛДРЕКС МаксГрип Лимон може да се наблюдават нежелани лекарствени реакции. Нежеланите реакции са редки и могат да включват главоболие, замаяване, нервност, безсъние, повишено кръвно налягане, гадене и повръщане.

**Ако някоя от гореизброените нежелани реакции Ви тревожи** прекалено или имате някакви нежелани реакции, не споменати в тази листовка се консултирайте с Вашия лекар.

Спрете приема на КОЛДРЕКС МаксГрип Лимон ако наблюдавате:

- алергични реакции, напр. сърбеж, обрив, проблеми с дишането, поява на оток по устните, езика, гърлото или лицето, язви в устата;
- неочаквано кървене или склонност към насиняване;
- проблеми със сърдечния ритъм (неочаквано сърцебиене);
- загуба или нарушение на зрението;
- или сте имали проблеми с дишането при употреба на ацетилсалицилова киселина или нестероидни противовъзпалителни лекарства в миналото.

#### 5. СЪХРАНЕНИЕ НА КОЛДРЕКС МаксГрип Лимон

Да се пази на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява при температура под 25°C.

Не използвайте след датата, посочена на опаковката.

#### 6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

**Какво съдържа КОЛДРЕКС МаксГрип Лимон?**

Всяко саше съдържа 6,427g бял прах с аромат на лимон.

Активни вещества:

парацетамол	1000mg
фенилефринов хидрохлорид	10mg
аскорбинова киселина (витамин C)	40mg

Всяко саше съдържа също така лимонена киселина, силициев диоксид, царевично нишесте, натриев цитрат, захар, натриев цикламат, захарин натрий, естествен куркумин (E100), лимонова есенция.

**Какво има в опаковката?**

COLDREX® MaxGrip Lemon

Опаковката съдържа 5 или 10 сашета

**Кой произвежда КОЛДРЕКС МаксГрип Лимон?**

Притежател на разрешението за употреба:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare,

GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS, Великобритания

Производител:

SmithKline Beecham S.A., Cda. De Ajalvir, Km 2.5

Alcala de Henares, 28903 Madrid, Испания

Срок на годност: 3 години

Без лекарско предписание.

Последна актуализация – май 2010



GlaxoSmithKline

Coldrex® е търговска марка на GlaxoSmithKline group of companies.

11000000008322