



COLDREX* Tablets КОЛДРЕКС* Таблетки

110036



Прочетете внимателно цялата тази листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КОЛДРЕКС таблетки И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?

КОЛДРЕКС таблетки се използва за облекчаване на симптомите при настинка и грип: повишена температура, главоболие, болки при възпалено гърло, хрема и запушен нос, болка при синусит и мускулни болки.

Съдържа парацетамол – аналгетик (болкоуспокояващо средство) и антипиретик (понижава температурата), фенилефринов хидрохлорид – деконгестант, който предизвиква отбъбване на лигавицата на носа и синусите, помагайки Ви да дишате по-леко, кофеин, който действа като лекстимулант, терпин хидрат – експекторант (отхрачващо средство) и аскорбинова киселина (витамин С), който обикновено се прилага при грип и възпалителни заболявания на горните дихателни пътища (настинки и грип) поради повишените нужди на организма, особено в началния стадий на заболяването.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМАТЕ КОЛДРЕКС таблетки

Запомнете: КОЛДРЕКС таблетки съдържа парацетамол.

Не приемайте с други лекарства, съдържащи парацетамол, лекарства за лечение на настинка и грип или за отпушване на носа.

Не приемайте КОЛДРЕКС таблетки, ако сте алергични към парацетамол, кофеин, фенилефринов хидрохлорид, терпин хидрат, аскорбинова киселина или някоя от другите съставки.

КОЛДРЕКС таблетки не се препоръчва по време на бременност.

Не приемайте КОЛДРЕКС таблетки ако приемате трициклически антидепресанти или други лекарства за лечение на депресия и приемате или през последните две седмици сте приемали инхибитори на моноаминооксидазата.

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете КОЛДРЕКС таблетки, ако:

- имате бъбречно или чернодробно заболяване;
- имате хипертония, сърдечно заболяване, заболяване на периферните кръвоносни съдове (болест на Рейно);
- приемате дигоксин или други лекарства за лечение на болести на сърцето;
- имате диабет или повишена функция на щитовидната жлеза;
- страдате от глаукома;
- имате феохромоцитом или проблеми с простатата;
- приемате антикоагуланти – лекарства, използвани за разреждане на кръвта;
- приемате лекарства за лечение на болест на Паркинсон;
- приемате бета-блокери или други лекарства за контрол на кръвното налягане;
- приемате средства за подтискане или стимулиране на апетита;
- кърмите.

Това лекарство съдържа кофеин. Избягвайте приемането на големи количества чай, кафе или кофеин съдържащи напитки докато приемате КОЛДРЕКС таблетки. Повишеният прием на кофеин може да Ви направи раздразнителни и напрегнати, да имате проблеми със съня или да изпитвате неприятно чувство на стягане и тежест в гърдите.

Бременност и кърмене

Лекарственият продукт не се препоръчва по време на бременност поради възможно повишаване на риска от спонтанен аборт, свързан с употребата на кофеин.

Парацетамол се екскретира в майчиното мляко, но няма данни да повишава риска за кърмачето. Поради съдържанието на фенилефрин лекарствения продукт трябва да се употребява по време на кърмене по лекарско предписание. Кофеин се излъчва в майчиното мляко и може да има стимулиращ ефект върху кърмачето, но токсични концентрации не са наблюдавани.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Не шофирайте и не работете с машини ако почувствате замаяност.

3. КАК ДА СЕ ПРИЕМА КОЛДРЕКС таблетки

За перорално приложение.

Възрастни, включително и тези над 65 години, и деца на и над 12 години:

1 (една) – 2 (две) таблетки на всеки 4-6 часа при необходимост.

Да не се приема на интервали по-кратки от 4 часа.

Не приемайте повече от 8 таблетки за период от 24 часа.

Не приемайте по-дълго от 7 (седем) дни без консултация с лекар.

54337
L607068/03

Деца от 6 – 12 години:

Половин до една таблетка на всеки 6 часа при необходимост.

Да не се приема на интервали по-кратки от 4 часа.

Да не се приемат повече от 4 таблетки за 24 часа.

Максимална продължителност на терапията без консултация с лекар 3 дни.

Да не се прилага при деца под 6 години.

Да не се надвишава препоръчаната доза.

Какво трябва да направите, ако приемете прекалено много?

Приемането на прекалено голямо количество може да увреди черния дроб. Ако вземете повече от препоръчаната доза, незабавно потърсете лекарска помощ, дори и да се чувствате добре.

Приемането на високи дози терпин хидрат и аскорбинова киселина могат да предизвикат стомашни проблеми, а кофеин и фенилефрин да ви направят раздразнителни и напрегнати.

Какво трябва да направите ако забравите или сте пропуснали да приемете необходимата доза?

Приемете дозата когато си спомните. Не приемайте двойна доза за да компенсирате пропуснатата.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

При парацетамол, нежеланите реакции са редки. Може да се наблюдават алергични реакции, напр. кожен обрив.

Спрете приема на лекарството и се консултирайте с Вашия лекар, ако:

- наблюдавате алергична реакция като сърбеж, обрив, проблеми с дишането, поява на оток по устните, езика, гърлото или лицето;
- се появяват язви в устата;
- сте имали проблеми с дишането при употреба на ацетилсалицилова киселина или нестероидни противовъзпалителни лекарства;
- имате неочаквано кървене или склонност към насяняване;
- почувствате загуба или замъгляване на зрението, като това е възможно да се появи по-често ако страдате от глаукома;
- чувствате необичайно ускоряване на пулса или прескачане на сърцето;
- наблюдавате задръжка на течности, като това е по-вероятно при мъже с уголемяване на простатата.

Оцветителят сънсет жълто (E110) може да предизвика алергична реакция при някои пациенти.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА КОЛДРЕКС таблетки

Да се пази на места, недостъпни за деца.

Да се съхранява при температура под 25°C.

Не използвайте след датата, посочена на опаковката.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа КОЛДРЕКС таблетки?

Всяка таблетка съдържа като активни вещества:

парацетамол	500mg
кофеин	25mg
фенилефринов хидрохлорид	5mg
терпин хидрат	20mg
аскорбинова киселина	30mg

Също така съдържа помощни вещества: царевичино нишесте, нишесте, талк, стеаринова киселина, повидон, калиев

сорбат, натриев лаурилсулфат, сънсет жълто (E110)

Как изглежда КОЛДРЕКС таблетки и какво съдържа опаковката?

КОЛДРЕКС таблетки са бяло-розови таблетки с форма на капсула със заоблени краища.

Опаковката съдържа 12 таблетки.

Притежателят на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба е:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
GlaxoSmithKline Export Ltd.
Brentford, TW8 9GS, Обединено кралство

Производител е:

GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd.,
Knockbrack, Dungarvan, Co. Waterford, Ирландия

и/или

HBM Pharma s.r.o.
036 80 Martin, Словакия

Срок на годност – 4 години.

Без лекарско предписание.

Последна актуализация – октомври 2010



GlaxoSmithKline

Coldrex® е регистрирана търговска марка на GlaxoSmithKline group of companies

54337
L607068/03