



110059

Листовка: информация за пациента

ГелоМиртол® форте 300 mg стомашно-устойчиви капсули, меки
стандартизиран Миртол

GeloMyrtol® forte 300 mg gastro-resistant capsules, soft
Myrtol standardized

**Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация**

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява ГелоМиртол® форте и за какво се използва
2. Преди да използвате ГелоМиртол® форте
3. Как да използвате ГелоМиртол® форте
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ГелоМиртол® форте
6. Допълнителна информация

1. Какво представлява ГелоМиртол® форте и за какво се използва

ГелоМиртол® форте са стомашно-устойчиви капсули, меки

ГелоМиртол® форте се използва за симптоматично лечение на остри и хронични бронхити и синуити.

ГелоМиртол® форте повлиява секрецията и кашлицата при заболявания на дихателните пътища, втечнява състенния секрет, засилва отделянето му, улеснява отхрачването и има противовъзпалителен ефект.

2. Преди да използвате ГелоМиртол® форте

Не използвайте ГелоМиртол® форте

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към стандартизиран миртол или някоя от останалите съставки на ГелоМиртол® форте.

Употреба на други лекарства

Няма известни взаимодействия с други лекарства.

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или насърко сте приемали други лекарства, дори такива, които се отпускат без лекарско предписание.

Прием на ГелоМиртол® форте

Капсулите ГелоМиртол® форте се приемат ½ час преди хранене с голямо количество хладна течност.

Специални предупреждения

Ако след прием на лекарствения продукт симптомите продължават или състоянието се влоши, да се направи консултация с лекар.

Бременност и кърмене

Въпреки че липват съобщения за тератогенен ефект по време на бременност, особено през първото трimesечие, ГелоМиртол® форте може да се прилага само след консултация с лекар.

Възможно е преминаване на ГелоМиртол® в майчиното мляко поради липофилни свойства.

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата, на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини

ГелоМиртол® форте няма влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

Важна информация, относно някои от съставките на ГелоМиртол® форте

ГелоМиртол® форте съдържа сорбитол. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някой захар, посъветвайте се с него, преди да вземете този продукт.

3. Как да използвате ГелоМиртол® форте

Ако не е предписано друго, да се спазват следните указания:

Възрастни и деца над 10 години приемат при остри възпаления по 1 капсула 3-4 пъти дневно, при хронични заболявания се приема по 1 капсула 2 пъти на ден, като тази дозировка се препоръчва и за поддържаща терапия. При хронични бронхити за улесняване на сутрешното отхрачване се приема по 1 капсула ГелоМиртол® форте допълнително вечер преди лягане.

За по-добър сън последната доза да се приема преди лягане.

Продуктът не е подходящ за деца под 10 годишна възраст.



224320005/2





Продължителност на лечението

Продължителността на лечението с ГелоМиртол® форте зависи от оплакванията. При хронични заболявания на дихателните пътища е възможно приемане на медикамента продължително време.

Ако сте приели повече от необходимата доза ГелоМиртол® форте?

Ако сте приемали по-голямо количество ГелоМиртол® форте, следните мерки трябва да бъдат предприети от Вашия лекар:

Течен парафин 3ml/kg тегло перорално, промивка на stomаха с 5 % разтвор на натриев бикарбонат, поставяне на кислородна маска.

Ако сте пропуснали да приемете ГелоМиртол® форте

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате никакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Като всички лекарства, ГелоМиртол® форте може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

В единични случаи могат да се появят оплаквания в stomашно-чревната област, като подуване, болка, гадене, диария, както и да настъпи раздвижване на намиращи се в жълчката и бъбреците камъни.

В отделни случаи се наблюдават алергични реакции /напр. обриви по кожата, отоци по лицето, задух или нарушения в кръвообращението/.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. Как да съхранявате ГелоМиртол® форте?

Да се съхранява под 25 °C!

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Срок на годност

Срокът на годност на продукта е 3 години.

Да не се употребява след изтичане на годност, отбелаян на опаковката!

6. Допълнителна информация

Какво съдържа ГелоМиртол® форте

Една stomашно-устойчива капсула, мека ГелоМиртол® форте съдържа:

Активно вещество:

Стандартизиран миртол (*Myrtol standardized*) 300 mg, включващ минимум 75 mg лимонен /*limonen*/, 75 mg цинеол /*cineole*/ и 20 mg α-пинен /*α-pinene*/.

Помощи вещества:

Рапично масло, рафинирано, желатин, глицерол 85 %, сорбитол течен (некристализиращ), хипромелоза ацетат сукцинат, триетил цитрат, натриев лаурил суфат, талк, дексстрин, амониев глициризат, хидрохлоридна киселина, разредена.

Как изглежда ГелоМиртол® форте и какво е съдържанието на опаковката

Стомашно-устойчиви капсули, меки по 20 броя в опаковка

Притежател на разрешението за употреба

G. Pohl-Boskamp GmbH & Co KG, Kieler Strasse 11, 25551 Hohenlockstedt, Германия

Производители:

G. Pohl-Boskamp GmbH & Co KG
Kieler Strasse 11
25551 Hohenlockstedt, Германия

Медицинско представителство в България:

Либра ЕАД
Бул. Акад. Стефан Младенов №6,
1700 София

Дата на последна редакция на листовката

12.02.2010

POHL BOSKAMP



224320005-2 140 6/2011

