

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ДИЙП РИЛИЙФ 50 mg/g+30 mg/g гел
DEEP RELIEF 50 mg/g+30 mg/g gel

Ибупрофен / Левоментол
Ibuprofen / Levomenthol

Дийп Рилийф

Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведовете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Дийп Рилийф гел и за какво се използва
2. Преди да използвате Дийп Рилийф гел
3. Как да използвате Дийп Рилийф гел
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Дийп Рилийф гел
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДИЙП РИЛИЙФ ГЕЛ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Дийп Рилийф е гел за локално приложение, който успокоява болката и има противовъзпалително действие. Използва се за симптоматично облекчаване на ревматични и мускулни болки и възпаление при изкълчвания, навяхване и спортни травми.

Дийп Рилийф съдържа Ибупрофен, който е от групата на нестероидните противовъзпалителни средства (NSAIDS) и осигурява ефективно и дълготрайно облекчение на болката, намалява възпалението и отока. Левоментол има охлаждащ ефект и осигурява допълнително облекчение на болката. Съставът на гела с двойно действие позволява бърза и концентрирана абсорбция на активните вещества през кожата на мястото на болката. Резултатът от комбинацията на ибупрофен и левоментол, заедно с помощното вещество диметилпропаноламин е незабавно и

2-2640

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ДИЙП РИЛИЙФ ГЕЛ

Не използвайте Дийп Рилийф (свързани с него) ако сте алергични (свързани с него) към ибупрофен, левоментол или към някоя от останалите съставки на Дийп Рилийф. Гелът е противопоказан при пациенти с астма, при които аспиринът или нестероидните противовъзпалителни средства предизвикват астматични пристъпи, ринити или уртикария.

Обърнете специално внимание при употребата на Дийп Рилийф

- Само за външна употреба върху здрава кожа!
- Да не се нанася върху отворени рани, възпалена или наранена кожа!
- Да не се нанася в близост до очите!
- Да не се използва с оклузивни превръзки!
- Ръцете трябва да се измият след нанасянето на продукта.
- Да се прекрати употребата на гела, ако кожата или болното място е силно раздразнено!
- При поглъщане на гела, пациентът трябва веднага да се свърже с лекар от най-близката спешна медицинска помощ!
- Да не се използва от деца под 12 години!
- Не излагайте на слънчева светлина третираната област веднага след нанасяне на гела.

Употреба на други лекарства

Избягвайте едновременната употреба с аспирин или други нестероидни противовъзпалителни средства.

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Бременност и кърмене

Бременните жени и кърмачките трябва да избягват употребата на Дийп Рилийф гел. Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини

Локалното приложение на Дийп Рилийф гел не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

Всички права запазени



3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ДИЙП РИЛИЙФ ГЕЛ

Възрастни и деца над 12 години.

Дийп Рилийф гел се нанася върху засегнатата зона с леки масажни движения до пълното му попиване. Апликацията се повтаря, но не повече от 3 пъти дневно. Да не се нанася на интервали по-малки от 4 часа. За всяка апликация се използва 1-4 см от гела.

Гелът е подходящ за употреба по време на физиотерапевтични процедури (ултразвук, йонофореза).

Ако след две седмици не настъпи подобрение, задължително се провежда консултация с лекар.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Дийп Рилийф гел

Предозирането е малко вероятно поради локалното приложение на препарата. Симптомите от предозирание на ибупрофен включват главоболие, повръщане, сънливост и хипотензия.

Ако сте пропуснали да използвате Дийп Рилийф гел

Не употребявайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Дийп Рилийф гел може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Възможни се кожни реакции на мястото на приложение (обриви, сърбеж и уртикария), както и стомашни проблеми (стомашни болки, диспепсия).

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ДИЙП РИЛИЙФ ГЕЛ

Съхранявайте под 25°C.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Не използвайте Дийп Рилийф след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Дийп Рилийф

Активните вещества са: ибупрофен 50 mg/g и левоментол 30 mg/g.

Другите съставки са: пропиленгликол, диизопропаноламин, карбонмер, денатуриран етанол, дестилирана вода.

Как изглежда Дийп Рилийф и какво съдържа опаковката

Дийп Рилийф е прозрачен, безцветен гел за локално приложение. Предлага се в алуминиева туба с маса на напълване 50 g, поставена в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба и производител



Mentholatum Company Ltd,
1 Redwood Avenue, Peel Park Campus, East
Kilbride, G74 5PE, Великобритания

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

БУЛГЕРМЕД ВЕ ООД
Ул. Светослав Тертер 24
1124 София
тел. 02 942 70 70

**Дата на последно одобрение на листовката:
20.01.2010**