

**Листовка: Информация за потребителя**

Tartephedreel, oral drops, solution  
Тартефедрил, перорални капки, разтвор

Хомеопатичен лекарствен продукт

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВОТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рез. № .....	26011075
Разрешение № .....	11-23351, 30-09-2013
Обсечение № .....	/

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

**В тази листовка**

1. Какво представлява Тартефедрил и за какво се използва
2. Преди да приемете Тартефедрил
3. Как да приемете Тартефедрил
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Тартефедрил
6. Допълнителна информация

**1. Какво представлява Тартефедрил и за какво се използва**  
Хомеопатичен лекарствен продукт.

Бронхити, вкл. астматични; непродуктивна кашлица, особено при астма и коклюш; катар на дихателните пътища

**2. Преди да приемете Тартефедрил**

- Не приемайте Тартефедрил ако имате свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта. При заболявания на щитовидната жлеза продукта да не се използва без лекарско предписание. При продължителна персистираща симптоматика, задух или възпаление, или изкашляне на храчки или кръв се консултирайте с лекар. Този продукт съдържа 35 об.% етанол (алкохол), т.е. до 150,2 mg за доза (10 капки), равно на 3 ml бира или 1,27 ml вино (при съответно 5 об.% и 12 об.% етанол). Да не се приема от лица, страдащи от алкохолизъм. Да се вземе под внимание при бременни или кърмачки, деца и високо-рискови групи като пациенти с чернодробни заболявания или епилепсия.
- Употреба на други лекарства – не са известни лекарствени взаимодействия
- Употреба на Тартефедрил с храни и напитки – няма несъвместимости
- Бременност и кърмене – посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.
- Шофиране и работа с машини – Тартефедрил не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини

**3. Как да приемете Тартефедрил**

Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.



- При възрастни и деца над 6 год. възраст, обикновено 3 пъти по 10 капки дневно.  
 При остри състояния – по 10 капки на всеки 15 мин. (за период от 2 часа).  
 - Употреба при деца - при деца до 2 год. възраст – по 3 капки 3 пъти дневно.  
 От 2 до 6 год. възраст – по 5 капки 3 пъти дневно.  
 - Ако сте приели повече от обичайната доза – Тартефедрил няма доза на предозиране  
 - Ако сте пропуснали да приемете Тартефедрил – Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а продължете по указаната схема.  
 - Ако сте спрели употребата на Тартефедрил – Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.  
 - Ако симптомите продължат или състоянието се влоши да се направи консултация с лекар

#### 4. Възможни нежелани реакции

В много редки случаи може да се появи реакция на свръхчувствителност

##### Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев” № 8

1303 София

Тел.: +35 928903417

уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg)

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

#### 5. Как да съхранявате Тартефедрил

Без специални условия на съхранение.

Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца !

Срок на годност – 5 години.

Срок на годност след първо отваряне на флакона – 6 месеца.

Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

#### 6. Допълнителна информация

- Какво съдържа Тартефедрил

100 g съдържат:

Активни вещества:

Arsenum iodatum	D6	10.0 g
Atropa belladonna	D4	10.0 g
Blatta orientalis	D6	5.0 g
Illicium verum	D3	5.0 g
Kalium stibyltartaricum	D4	10.0 g
Lobelia inflata	D4	5.0 g



Naphthalinum	D6	5.0 g
Natrium sulfuricum	D4	10.0 g
Psychotria ipecacuanha	D4	5.0 g

Помощни вещества:

Етанол 96%

Пречистена вода

**Съдържа 35 об.% алкохол**

- Как изглежда и какво съдържа опаковката: Кафява стъклена бутилка тип III (30 ml), капачка на винт от PP и апликатор-капкомер от PE, поставени в картонена кутия

- Производител и притежател на разрешението за употреба и производител:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

D-76532 Baden-Baden, Германия

- Дата на последно одобрение на листовката: 07.2012

