

При:**Умора, оток и болки в краката****Повърхностни разширени вени****Синини от контузии**

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Лиотон 1000® гел 1000 IU/g**Lioton 1000® Gel 1000 IU/g**

Хепарин натрий (Heparin sodium)

Прилагане върху кожата

Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждате от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ в случай, че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Лиотон 1000® гел и за какво се използва
2. Преди да използвате Лиотон 1000® гел
3. Как да използвате Лиотон 1000® гел
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Лиотон 1000® гел
6. Допълнителна информация

1. Какво представлява Лиотон 1000® гел и за какво се използва

Лиотон 1000® гел е хепаринов продукт под форма на гел за външно приложение, поради което е показан за лечение, самостоятелно или в комбинация със системна терапия, при възпалителни или травматични състояния, които се повлияват благоприятно от лекарства с противосирващо, противовъзпалително и противооточно действие.

Лиотон 1000® гел е предназначен за лечение на заболявания на по-

върхностните вени като варикозно разширени вени и свързаните с тях усложнения: флеботромбоза, тромбофлебит, повърхностен перифлебит, варикозни язви, следоперативен микофлебит, последствия след сафенектомия (отстраняване на вена сафена). Лиотон 1000® гел се прилага и при локализиран оток и болки, подкожни хематоми (синини), травми и контузии на мускули, сухожилията и ставните връзки.

2. Преди да използвате Лиотон 1000® гел**Не използвайте Лиотон 1000® гел**

Не трябва да използвате Лиотон 1000® гел, ако сте свръхчувствителни към хепарин или някоя от другите съставки на лекарството. Лиотон 1000® гел не трябва да се използва в случай на кръвоте-

чение, върху открити рани и върху лигавици, както и върху инфицирани участъци при наличие на гнойни процеси. Поради ограничен опит и липса на данни, не трябва да се използва при деца.



Обърнете специално внимание при употребата на Лиотон 1000® гел

Употребата на Лиотон 1000® гел при данни за кръвотечение трябва внимателно да се преценява.
Лиотон 1000® гел съдържа съставките метил и пропил парахидроксилензоат и затова не трябва да се използва при пациенти със свръхчувствителност към тези вещества.

Употреба на други лекарства

Приложението на Лиотон 1000® гел може допълнително да увеличи времето на кръвостисирване при пациенти, приемащи перорални противосъсирващи лекарства.

3. Как да използвате Лиотон 1000® гел

Един до три пъти дневно, 3-10 см гел се нанасят върху засегнатия участък от кожата и леко се втряват.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Лиотон 1000® гел

Въпреки че до момента не са описани случаи на предозиране, при появя на съмнение за такова се обърнете към Вашия лекар.

Бременност и кърмене

Няма налични данни за използването на Лиотон 1000® гел по време на бременност или в периода на кърмене.

Шофиране и работа с машини

Лиотон 1000® гел не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Лиотон 1000® гел може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Много рядко може да възникнат алергични реакции към хепарина на мястото на приложение. В изолирани случаи могат да се появят реакции на свръхчувствителност като зачевряване на

кожата и сърбеж, които изчезват след преустановяване на лечението.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. Как да съхранявате Лиотон 1000® гел

Да се съхранява под 25°C!
Да се съхранява на място, недостъпно за деца!
Не използвайте Лиотон 1000® гел след срока на годност, отбелзан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Допълнителна информация

Какво съдържа Лиотон 1000® гел

- Активното вещество е: хепарин натрий (heparin sodium). Един грам Лиотон 1000® гел съдържа 1000 IU хепарин натрий.
- Другите съставки са: карбомер 940, метил парахидроксилензоат, пропил парахидроксилензоат, етанол, масло от цвет на горчив портокал, лавандулово масло, троламин и пречистена вода.

Как изглежда Лиотон 1000® гел и какво съдържа опаковката

Лиотон 1000® гел е безцветен, прозрачен гел с приятен аромат, който не е мазен и не оставя петна.

Лиотон 1000® гел е опакован в меки алуминиеви туби. Алуминиева мембрана е поставена на отвора на тубата и е необходимо да бъде пробита с капачката преди употреба.

Лиотон 1000® гел може да намерите в туба от 30 g, 50 g или 100 g.

Притежател на разрешението за употреба на Лиотон 1000® гел

A. MENARINI Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l.
Via Sette Santi 3, 50131 Florence, Италия

Производител на Лиотон 1000® гел

A. MENARINI Manufacturing Logistics and Services s.r.l.
Via Sette Santi 3, 50131 Florence, Италия

Лиотон 1000® гел се разпространява от

BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Германия

Дата на последно одобрение на листовката

Юни 2008 г.

bulg./V 054557/01

