

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ВИБРОЦИЛ

0.25%/0.025% Капки за нос, разтвор
Фенилефрин/Диметинденов малеат

VIBROCIL

0.25%/0.025% Nasal drops, solution
Phenylephrine/Dimethindene maleate

Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за вас информация.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както ви е казал вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.
- Ако след 5 до 7 дни не се чувствате по-добре или състоянието ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява **ВИБРОЦИЛ 0.25%/0.025% Капки за нос, разтвор** и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате **ВИБРОЦИЛ 0.25%/0.025% Капки за нос, разтвор**
3. Как да използвате **ВИБРОЦИЛ 0.25%/0.025% Капки за нос, разтвор**
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате **ВИБРОЦИЛ 0.25%/0.025% Капки за нос, разтвор**
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява **ВИБРОЦИЛ**

0.25%/0.025% Капки за нос, разтвор и за какво се използва

ВИБРОЦИЛ 0.25%/0.025% Капки за нос, разтвор съдържа назален деконгестант (фенилефрин) и антихистамин (диметинденов малеат). Той осигурява бързо и дълготрайно облекчение на запушения и течащ нос (хрема), предизвикано от широк кръг инфекциозни или алергични нарушения на горните отдели на дихателния тракт. Подпомага освобождаването на носните проходи, облекчавайки хремата и отока. **ВИБРОЦИЛ 0.25%/0.025% Капки за нос, разтвор** не променя активността на носните цилии.

ВИБРОЦИЛ 0.25%/0.025% Капки за нос, разтвор се използва за облекчаване на назалната конгестия в случай на простуда, остър и хроничен ринит, сенна хрема или друг алергичен ринит (алергия към домашен прах, животинска косина и др.), вазомоторни ринити и синусити.

ВИБРОЦИЛ 0.25%/0.025% Капки за нос, разтвор се употребява като допълнителна терапия при лечение на възпаление на ушите (отит).

ВИБРОЦИЛ 0.25%/0.025% Капки за нос, разтвор може да ви бъде предписан от лекар за пре- и постоперативни грижи при хирургични интервенции на носа.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате **ВИБРОЦИЛ 0.25%/0.025% Капки за нос, разтвор**

Не използвайте **ВИБРОЦИЛ 0.25%/0.025% Капки за нос, разтвор**

- ако сте алергични към активните вещества или към някоя от останалите съставки на **ВИБРОЦИЛ 0.25%/0.025% Капки за нос, разтвор**;
- ако страдате от атрофичен ринит (заболяване на носната лигавица с хронично възпаление и образуване на корустки);
- ако вземате или сте вземали през последните 2 седмици лекарство по лекарско предписание, съдържащо моноаминоксидазен инхибитор (MAO инхибитори, които се използват за лечение на депресия и други психични заболявания). Консултирайте се с вашия лекар или фармацевт, преди да използвате **ВИБРОЦИЛ 0.25%/0.025% Капки за нос, разтвор**, ако не сте сигурни дали предписаното ви лекарство съдържа MAO инхибитор.

Обърнете специално внимание при употребата на **ВИБРОЦИЛ 0.25%/0.025% Капки за нос, разтвор**

Информирайте вашия лекар, ако имате сърдечно заболяване, високо кръвно налягане, заболяване на щитовидната жлеза или глаукома.

Не използвайте **ВИБРОЦИЛ 0.25%/0.025% Капки за нос, разтвор** в продължение на повече от една седмица. Ако симптомите продължават, информирайте вашия лекар. Не надвишавайте препоръчаната доза, особено при деца и много възрастни пациенти.

ВИБРОЦИЛ 0.25%/0.025% Капки за нос, разтвор не трябва да се използват без лекарска препоръка при деца под една година.

Други лекарства и **ВИБРОЦИЛ 0.25%/0.025% Капки за нос, разтвор**

Моля информирайте вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта. Консултирайте се с вашия лекар, ако приемате антидепресанти или лекарства за високо кръвно налягане (например бета-блокери).

ВИБРОЦИЛ 0.25%/0.025% Капки за нос, разтвор с **"БЕ.ФИТ" ООД** **храни и напитки**

Няма данни определени храни и напитки да се вземат под внимание при употребата им с **ВИБРОЦИЛ 0.25%/0.025% Капки за нос, разтвор**.

Бременност и кърмене

Употребата на **ВИБРОЦИЛ 0.25%/0.025% Капки за нос, разтвор** не се препоръчва по време на бременност и кърмене.

Шофиране и работа с машини

Няма данни прилагането на **ВИБРОЦИЛ 0.25%/0.025% Капки за нос, разтвор** да оказва влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

ВИБРОЦИЛ 0.25%/0.025% Капки за нос, разтвор съдържа:

Четири капки **ВИБРОЦИЛ 0.25%/0.025% Капки за нос, разтвор** съдържат до 5 мкг сорбитол.

Пациенти с рядка форма на наследствена непоносимост към фруктоза не трябва да приемат това лекарство.

3. Как да използвате **ВИБРОЦИЛ 0.25%/0.025% Капки за нос, разтвор**

ВИБРОЦИЛ 0.25%/0.025% Капки за нос, разтвор

Деца до една година (по лекарска препоръка): 1 капка във всяка ноздра 3 до 4 пъти дневно.

Деца от 1 до 6 год.: 1 до 2 капки във всяка ноздра 3 до 4 пъти дневно.

Възрастни и деца над 6 год.: 3 до 4 капки във всяка ноздра 3-4 пъти дневно.

Инструкции за употреба:

ВИБРОЦИЛ 0.25%/0.025% Капки за нос, разтвор

Издухайте си носа. Ако сте в изправено положение, наклонете назад главата. Ако сте легнали, провисете глава отстрани на леглото. Поставете капките във всяка ноздра и задръжте главата назад няколко минути, така че лекарството да се разпредели в носа.

За бебета със запушен нос се препоръчва капките да се поставят преди хранене за подпомагане на кърменето.

Ако сте приели повече от необходимата доза **ВИБРОЦИЛ 0.25%/0.025% Капки за нос, разтвор**

При инцидентно предозиране информирайте незабавно вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да използвате **ВИБРОЦИЛ 0.25%/0.025% Капки за нос, разтвор**

Приемете следващата доза в обичайното време. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Ако имате други въпроси относно употребата на този лекарствен продукт, се консултирайте с вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Като всички лекарства, **ВИБРОЦИЛ 0.25%/0.025% Капки за нос, разтвор** може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Обикновено **ВИБРОЦИЛ 0.25%/0.025% Капки за нос, разтвор** се понася много добре. Могат да се наблюдават редки и преходни случаи на леко чувство на парене или сухота на мястото на прилагане в носа. Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.

5. Как да съхранявате **ВИБРОЦИЛ 0.25%/0.025% Капки за нос, разтвор**

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява под 30 °C.

Да се използва до 24 дни след отваряне на опаковката.

Не използвайте **ВИБРОЦИЛ** след срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа **ВИБРОЦИЛ 0.25%/0.025% Капки за нос, разтвор**

Активните вещества са: Фенилефрин 0.25% и Диметинден нов малеат 0.025%

Другите съставки са: бензалкониев хлорид (консервант), динатриев фосфат, лимонена киселина монохидрат, сорбитол, детерпентирана есенция от лавандула, пречистена вода.

Как изглежда **ВИБРОЦИЛ 0.25%/0.025% Капки за нос, разтвор и какво съдържа опаковката**

ВИБРОЦИЛ 0.25%/0.025% Капки за нос, разтвор - 15 ml тъмна стъклена бутилка с капкомер.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Novartis Consumer Health GmbH,
Zielstattstrasse 40,
81379 München, Германия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

Салвис Фарма ООД,
1528 София, ул. Димитър Пешев 5,
тел./факс: +359/882532901

Дата на последно преразглеждане на листовката
26 Март 2012

