

Strepsils[®] intensive

Flurbiprofen 8.75mg

Стрепсилс Интензив

Флурбипрофен 8.75mg

Таблетки за смучене

Моля, прочетете внимателно листовката, преди да започнете да ползвате лекарствения продукт. Запазете я, може да ви бъде полезна да я прочетете отново. Ако имате повече въпроси след прочитането и, попитайте вашия лекар или фармацевт.

► Какво съдържат таблетките за смучене Стрепсилс Интензив?

Всяка таблетка съдържа: активно вещество флурбипрофен 8.75mg и следните помощни вещества: захароза, глюкозен сироп, мед, макогроз 300, аромат на лимон, калиев хидроксид, левоментол.

Всяка таблетка съдържа 2.5g вълнехипрати.

Опаковката съдържа 2, 4, 6, 8, 10, 12 или 16 таблетки.

► Какъв лекарствен продукт е Стрепсилс Интензив и как действа?

Стрепсилс Интензив облекчава симптомите, характерни при зачервено и болезнено-възпалено гърло. Половин час след приемане на таблетката, се наблюдава облекчение на болката и намаляване на дразненето в гърлото.

Ако се нуждаете от допълнителна информация, относно вашето състояние, посъветвайте се с лекар или фармацевт.

Активното вещество на продукта – флурбипрофен принадлежи към групата на нестероидните противовъзпалителни

лекарствени продукти (НСПВС), които намаляват възпалението и облекчават болката.

Стрепсилс Интензив се отпуска без лекарско предписание.

► Прочетете внимателно преди да започнете да взимате Стрепсилс Интензив таблетки

Не трябва да приемате Стрепсилс Интензив таблетки ако:

- имате или сте имали язва на стомаха или дванадесетопръстника
- сте алергични към флурбипрофен, ацетилсалицилова киселина или други НСПВС, или към някоя от съставките на лекарствения продукт
- сте имали затруднено дишане, алергични обриви, уртикария или сърбежи, появява се алергична хрема, когато взимате флурбипрофен, ацетилсалицилова киселина или други НСПВС
- вашата възраст е под 12 години

■ При приемане на Стрепсилс Интензив понякога е възможно появата на световъртеж или замъглено виждане. Ако тези симптоми се появят не шофирайте и не работете с машини.

Предупреждения:

Лекарства като Стрепсилс Интензив могат да бъдат свързани с леко увеличен риск от сърдечен инцидент („миокарден инфаркт“) или инсулт. Всеки риск е по-вероятен при високи дози и при продължително лечение. Не превишавайте препоръчаните дози и продължителността на лечението 3 дни.

Ако имате проблеми със сърцето, прекаран инсулт или мислите, че за Вас може да е опасен от появата им (например ако имате високо кръвно налягане, диабет, повишени стойности на холестерол или сте пушач) трябва да обсъдите лечението с Вашия лекар или фармацевт.

► Консултирайте се с вашия лекар преди да започнете да взимате Стрепсилс Интензив таблетки ако:

- сте бременни, не се препоръчва употреба през последното тримесечие
- харите, лекарственият продукт се появява в много ниски концентрации в кърмата, но вероятността да влияе неблагоприятно на кърмачето е малка
- имате астма или сте получавали астмагични пристъпи
- имате бъбречни, сърдечни или чернодробни проблеми
- имате високо кръвно налягане или имате удължено време на кръвосъсирване
- ако сте диабетик или не можете да приемате захар (всяка таблетка съдържа 2.5g комбинация от захароза, глюкоза и свързани захари)
- имате проблеми с разграждането на захарите - глюкоза, фруктоза, захароза, малтоза, галактоза (Стрепсилс Интензив таблетки не са подходящи, ако имате наследствена непоносимост към фруктоза, синдром на глюкозо галактозна малабсорбция или захарозо-изомалтозен дефицит)
- редовно приемате други лекарствени продукти:



- облекчаващи болката или прилагани при простудни заболявания, други съдържащи ацетилсалицилова киселина
- ибупрофен, флурбипрофен или от групата на НСПВС
- улесняващи отделянето на течности (диуретици), съдържащи фуросемид
- лекарствени продукти за високо кръвно налягане (бета блокери)
- лекарствени продукти против съсирване на кръвта (антикоагуланти), например варфарин
- хинюлинови антибактериални лекарства, като ципрофлоксацин или налидиксова киселина
- литий
- мифепристон

► Как да взимате Стрепсилс Интензив таблетки?

За възрастни и деца над 12 години:

Една таблетка се смуче бавно през 3-6 часа.

Да не се приемат повече от 5 таблетки за 24 часа.

За да действа по предназначение таблетката трябва бавно да се разтвори в устата. Не я дъвчете, хрускайте или гълтайте цяла. Движете таблетката в устата, докато я смучете.

► Докато приемате Стрепсилс Интензив таблетки:

- Ако срещите и приемете повече таблетки от посочената доза или ако дете под 12 години приеме Стрепсилс Интензив таблетки, уведомете незабавно вашия лекар. Вземете опаковката и листовката със себе си.
- Ако вашето гърло не се подобри след лечение от 3 дни или симптомите се задълбочават, или се появят нови, консултирайте се с лекар или фармацевт.

Нежелани ефекти:

Много рядко при някои хора могат да се появят следните нежелани лекарствени реакции, характерни за НСПВС:

- Чувство на изтръпване в устата или необичаен вкус, докато смучете таблетката.
- Поява на язвици в устата или дразнене (не забравяйте да движите таблетката, докато я смучете)
- Шум в ушите или кървене от носа
- Стомашни смущения или болка, гадене, диария, много рядко стомашна болка с оцветени в черно изпражнения (стомашна язва или кървене)
- Кожни обриви, сърбежи и подутини върху кожата, сърбящ и течаш нос, влошаване на астма или затруднения при дишане
- Задължаване на течности в тялото и подуване на краката, смущения в зрението, замаяване, бъбречни или чернодробни проблеми, пожълтяване на кожата (жълтеница) и изключително рядко склонност към лесно получаване на синяци или кървене.

Ако се появят някои от тези нежелани реакции или други необичайни симптоми, или имате притеснения относно лекарствения продукт, спрете да го взимате и незабавно се консултирайте с лекар.

Лекарства като Стрепсилс Интензив могат да бъдат свързани с леко повишен риск от сърдечен инцидент („миокарден инфаркт“) или инсулт.

► Как да се съхранява лекарствения продукт?

Да не се изпозва след датата, посочена на опаковката.

Съхранявайте в оригиналната опаковка.

През деня, за кратковремена употреба, можете да отделите няколко таблетки от блистерната опаковка. Вземете със себе си листовката или си отбележете необходимата информация за безопасна употреба на лекарствения продукт.

Запомнете: Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

► Как можете да получите повече информация за Стрепсилс Интензив таблетки?

Листовката дава най-важната информация на пациента за Стрепсилс Интензив таблетки. Ако имате повече въпроси след прочитането и, попитайте вашия лекар или фармацевт, те ще ви дадат допълнителна информация.

Прилежател на разрешението за употреба:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.
103-105 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3UH, Великобритания

Производител:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.
Nottingham Site, Thane Road, Nottingham, NG90 2DB, Великобритания

Дата на ревизия на текста: август, 2007

