

Strepsils®

Стрепсилс таблетки за смучене Информация за пациентта

Strepsils Мед и Лимон

Strepsils Ментол и Евкалипт

Strepsils Портокал с Витамин С

Strepsils Класик

Какво се съдържа в Стрепсилс?

Всички варианти съдържат активните съставки:
Amylmetacresol 0.6 mg и 2,4-Dichlorobenzyl alcohol 1.2 mg

Допълнително:

Strepsils Ментол и Евкалипт съдържа Levomenthol 8 mg

Strepsils Портокал с Витамин С съдържа Vitamin C 100mg

Стрепсилс съдържа следните помощни вещества:

Стрепсилс Мед и Лимон - мед, винена киселина, ментово масло, лимоново масло, течна захароза, течна глюкоза, оцветител E104

Стрепсилс Ментол и Евкалипт - евкалиптово масло, винена киселина, течна захароза, течна глюкоза, оцветител E132

Стрепсилс Портокал с Витамин С - левоментол, винена киселина, пропилен гликол, портокалова есенция, течна глюкоза, течна захароза, оцветители E110, E124

Стрепсилс Класик - левоментол, винена киселина, асаноново масло, ментово масло, течна захароза, течна глюкоза, оцветители E124, E122

Как Стрепсилс действа?

Стрепсилс облекчава симптомите при инфекции на устната кухина и гърлото. Активните съставки 2,4 Дихлорбензил алкохол и Амилметакрезол имат антисептично действие и са ефективни срещу широк спектър от бактерии, познати като причинители на възпалителни заболявания в устната кухина и гърлото.

Ментолът, включен в състава на Стрепсилс Ментол и Евкалипт има меки аnestетични свойства и облекчава назалната конгестия.

Всяка таблетка Стрепсилс Портокал с Витамин С съдържа 100mg Витамин С, който е особено необходим за организма по време на инфекции.



110012

Прочетете преди да започнете да взимате Стрепсилс таблетки:

Не се препоръчва при:

- алергия към някоя от съставките
- диабетици и хора с вродена непоносимост към захароза и глюкозо/галактозен синдром.

Всяка таблетка Стрепсилс Ментол и Евкалипт и Стрепсилс Класик съдържат: 1g глюкоза и 1,5g захароза.

Всяка таблетка Стрепсилс Мед и Лимон и Стрепсилс Портокал с Витамин С съдържат: 1g глюкоза и 1,4g захароза.

Стрепсилс Ментол и Евкалипт не се препоръчва при деца под 5 годишна възраст.

Как да взимате Стрепсилс таблетки?

За възрастни и деца - по една таблетка се смуче бавно на всеки 2-3 часа.

Нежелани ефекти:

В изключително редки случаи може да се появи кожен обрив, чувство на изтръпване и парене в устата и затруднения при прегъщдане.

При появя на някой от тези симптоми е необходимо да уведомите Вашния лекар или фармацевт.

Предупреждение: Не превишавайте посочената доза.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Помнете: малки деца могат да се задавят.

За бременно и кърмещи преди употреба на лекарствения продукт е задължителна консултация с лекар или фармацевт.

Консултирайте се с лекар, ако симптомите продължават повече от 5 дни при възрастни и повече от 3 дни при деца или са придружени с висока температура и главоболие.

Предозиране е малко вероятно и би могло само да причини гастроинтестинален дискомфорт.

Да не се използва след изтичане срока на годност.

Да се съхранява под 25°C.

Опаковката съдържа 24 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.

103-105 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3UH, Великобритания

Производител:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.

Nottingham Site, Thane Road, Nottingham, NG90 2DB, Великобритания

Последна редакция на текста:

юли, 2006